

Số: 240 /SYT-QLD

Thanh Hóa, ngày 30 tháng 01 năm 2019

V/v cập nhật thông tin hướng dẫn
sử dụng đối với thuốc chứa
Phospholipid đậu nành

Kính gửi: Các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc trong tỉnh.

Căn cứ Công văn số 757/QLD-ĐK ngày 23/01/2019 của Cục Quản lý
Dược - Bộ Y tế về việc cập nhật thông tin hướng dẫn sử dụng đối với thuốc
chứa Phospholipid đậu nành

Theo thông báo của Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế tại công văn nêu trên, để
thống nhất về chỉ định, liều dùng và cách dùng thuốc chứa Phospholipid đậu
nành. Nhằm đảm bảo mục tiêu sử dụng thuốc hợp lý, an toàn và hiệu quả.

Sở Y tế thông báo:

- Các cơ sở khám chữa bệnh, các đơn vị kinh doanh thuốc trong tỉnh phải
thường xuyên cập nhật thông tin hướng dẫn đối với thuốc chứa Phospholipid
đậu nành;
- Đồng thời tăng cường thực hiện việc theo dõi tác dụng không mong muốn
của thuốc trong quá trình sử dụng và lưu hành; gửi báo cáo ADR (nếu có) về
Trung tâm Quốc gia về thông tin thuốc và theo dõi phản ứng có hại của thuốc
(13-15 Lê Thánh Tông, Hà Nội) hoặc Trung tâm khu vực về thông tin thuốc và

theo dõi phản ứng có hại của thuốc Tp. Hồ Chí Minh (201 B Nguyễn Chí Thanh, quận 5, Tp. Hồ Chí Minh);

- Việc kê đơn, sử dụng thuốc phải tuân thủ hoàn toàn theo chỉ định, chổng chỉ định, liều dùng và cách dùng (theo Phụ lục đính kèm công văn này).

Sở Y tế thông báo để các đơn vị được biết và triển khai thực hiện./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, QLD.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Phạm Ngọc Thơm



PHỤ LỤC

(Đính kèm Công văn số Xd/QLD ngày 30/01/2019 của Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa)

Các nội dung thay đổi/bổ sung đối với thuốc chứa chứa Phospholipid đậu nành.

(Đối với tất cả các thuốc chứa Phospholipid đậu nành, thông tin trên nhãn thuốc và tờ hướng dẫn sử dụng yêu cầu thay đổi nội dung các mục: chỉ định, chống chỉ định, liều dùng và cách dùng theo đúng các thông tin được cung cấp dưới đây).

1. Chỉ định:

Cải thiện các triệu chứng bệnh lý gan như chán ăn, đau hạ sườn phải, tổn thương gan do nhiễm độc và viêm gan.

2. Chống chỉ định:

Quá mẫn với protein đậu nành, đậu lạc hoặc bất kỳ thành phần nào của thuốc.

3. Liều dùng và cách dùng:

- Người lớn: 1800 mg/ngày chia 2-3 lần.
- Nên uống thuốc cùng bữa ăn.
- Không nên sử dụng thuốc này cho trẻ em dưới 18 tuổi do chưa được nghiên cứu đầy đủ